

KARTA OSTRZEGAWCZA DLA PACJENTA

Dabigatran etexilate Orion

Dabigatranum etexilatatum

- Pacjent/opiekun powinien nosić kartę zawsze przy sobie
- Należy upewnić się, że jest to ostatnia wersja

Szanowna Pacjentko, Szanowny Pacjencie, Szanowny Opiekunie dziecka!

Lekarz zalecił Pani/Panu lub dziecku stosowanie leku Dabigatran etexilate Orion. Aby bezpiecznie stosować lek Dabigatran etexilate Orion, należy zapoznać się z istotnymi informacjami w ulotce dla pacjenta.

Karta zawiera ważne informacje dotyczące leczenia Pani/-a lub dziecka, należy nosić ją zawsze przy sobie i zawsze informować lekarza, że przyjmuje Pani/Pan lub dziecko lek Dabigatran etexilate Orion.

Informacje dla pacjenta / opiekuna dziecka

Informacje dotyczące leczenia Pani/Pana lub dziecka

- Lek Dabigatran etexilate Orion rozrzedza krew. Jest stosowany w leczeniu istniejących zakrzepów krwi lub w zapobieganiu tworzeniu się niebezpiecznych zakrzepów krwi.
- Podczas przyjmowania leku Dabigatran etexilate Orion należy przestrzegać zaleceń lekarza. Nigdy nie należy pomijać dawki leku ani nie przerywać przyjmowania leku Dabigatran etexilate Orion bez konsultacji z lekarzem.
- Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie przez Panią/-a lub dziecko.
- Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Dabigatran etexilate Orion przed wszelkimi zabiegami chirurgicznymi / procedurami inwazyjnymi.
- Kapsułki Dabigatran etexilate Orion można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Kapsułek nie wolno kruszyć ani przeżuwać oraz nie wolno zażywać samych granulek.

Kiedy zasięgnąć porady lekarskiej

- Przyjmowanie leku Dabigatran etexilate Orion może zwiększać ryzyko krwawienia. Należy natychmiast zwrócić się do lekarza w przypadku wystąpienia u Pani/-a lub dziecka objawów krwawienia, takich jak: obrzęk, uczucie dyskomfortu, nietypowy ból lub ból głowy, zawroty głowy, bledność, osłabienie, nietypowe zasinienie, krwotoki z nosa, krwawienie z dziąseł, nietypowe długie krwawienie z miejsca skaleczenia, nieprawidłowe krwawienie miesiączkowe lub krwawienie z pochwy, obecność krwi w moczu, który może być koloru różowego lub brązowego, czerwone /czarne stolce, kaszel z krwią, wymioty krwawe lub fusowate.
- W razie upadku lub urazu, zwłaszcza urazu głowy, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza po poradę.
- Nie przerywać przyjmowania leku Dabigatran etexilate Orion bez konsultacji z lekarzem w przypadku wystąpienia u Pani/-a lub dziecka zgagi, nudności, wymiotów, uczucia dyskomfortu w żołądku, wzdęć lub bólu w nadbrzuszu.

Informacje dla fachowego personelu medycznego

- Lek Dabigatran etexilate Orion to doustny lek przeciwzakrzepowy (bezpośredni inhibitor trombiny).
- Może zaistnieć konieczność odstawienia leku Dabigatran etexilate Orion odpowiednio wcześniej przed zabiegami chirurgicznymi lub innymi procedurami inwazyjnymi.
- W przypadku poważnego krwawienia lek Dabigatran etexilate Orion należy odstawić natychmiast.

- Dla dorosłych pacjentów dostępny jest swoisty czynnik odwracający (idarucyzumab). Nie określono skuteczności ani bezpieczeństwa stosowania swoistego czynnika odwracającego, idarucyzumabu u dzieci i młodzieży.
W celu uzyskania szczegółowych informacji i porad dotyczących odwracania działania przeciwzakrzepowego leku Dabigatran etexilate Orion należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego Dabigatran etexilate Orion i idarucyzumabu.
- Lek Dabigatran etexilate Orion jest wydalany głównie przez nerki; konieczne jest picie odpowiedniej ilości płynów. Lek Dabigatran etexilate Orion może być usuwany w drodze dializy.

Należy wypełnić tę część lub zwrócić się do lekarza prowadzącego Pani/-a /dziecko z prośbą o jej wypełnienie.

Dane pacjenta

Imię i nazwisko pacjenta

Data urodzenia

Wskazanie do leczenia przeciwzakrzepowego

Dawka leku Dabigatran etexilate Orion